




ПОЛИОМИЕЛИТ

острое инфекционное заболевание вирусной этиологии. Паралитические формы возникают при поражении вирусом серого вещества спинного мозга. Клинически это выражается развитием парезов и параличей.

Источником возбудителя является человек: больной или носитель. Клинически выраженная инфекция встречается значительно реже носительства: на один клинический случай приходится от 100 до 1000 случаев бессимптомного носительства полиовируса. Полиовирус появляется в отделяемом носоглотки через 36 часов, а в испражнениях через 72 часа после заражения и продолжает обнаруживаться в носоглотке в течение одной, а в испражнениях – в течение 3-6 недель.



Длительность инкубационного периода при остром полиомиелите колеблется от 4 до 35 дней.

Симптомы заболевания

Непаралитическая форма полиомиелита		Паралитическая форма полиомиелита	
кратковременная лихорадка	кашель, насморк	Высокая температура	головная боль
боли в горле	тошнота, рвота, жидкий стул	характерные боли в мышцах	спутанность сознания

Смерть больного наступает от паралича дыхательных мышц. Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет.

Профилактические мероприятия

Улучшение санитарно-гигиенических условий способствуют ограничению распространения полиовируса, однако единственным специфическим средством предупреждения полиомиелита остается **иммунизация.**